

IDENTIFIKASI BENIH

Dahu (*Dracontomelon dao* (Blanco) Merr & Rolfa)

Sebaran tumbuh	Seluruh Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTT, Maluku, Papua, Burma, Thailand, Cambodia.
Musim buah	Oktober – Februari
Pengumpulan benih	Buah masak dikumpulkan dari atas pohon dengan jalan memanjat dibantu dengan galah berkait. Buah masak dicirikan dengan kulit buah berwarna kuning.
Ekstraksi benih	Buah diperam dalam karung selama 1 malam, kemudian digosok dengan tangan sampai daging buah lepas. Setelah itu dicuci bersih, kemudian diangin-anginkan.
Penyimpanan benih	Dengan persen kecambah awal 33%, menjadi 11% setelah disimpan 1 bulan, 7% setelah 2 bulan dan 0,5% setelah disimpan 4 bulan. Benih yang disimpan dalam tabung plastik tertutup pada ruang ber AC masih dapat berkecambah dengan baik (86%) setelah 3 minggu penyimpanan.
Perkecambahan	Benih mulai berkecambah pada hari ke 20 dengan rata-rata persen kecambah 33%. Di Malaysia berkecambah 85 – 95% dalam waktu 28 – 67 hari.
Pembiakan Vegetatif	Penanaman di lapangan dapat dilakukan dengan stump ukuran diameter batang 0,5 cm, panjang akar dan batang masing-masing 10 cm.
Pencegahan Hama dan Penyakit	-
Persemaian	Bibit disapih setelah berumur 1 – 2 bulan dimasukkan kedalam kantong plastik ukuran 10 x 15 cm yang sudah dilubangi bawahnya. Setelah tinggi 20 – 30 cm bibit siap ditanam dilapangan.

Sumber : Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia, Balai Teknologi Perbenihan, Departemen Kehutanan R.I